

FICHE TECHNIQUE

Poule Pondeuse Coucou

Gallus gallus domesticus



Caractère	Sociable, rustique, chair ferme, non bruyante
Origine race	France
Mœurs	Diurne
Poids	1,900kg à 18 semaines et jusqu'à 2,5kg
Esp. de vie	Jusqu'à 10 ans
Œufs	Jusqu'à 300 œufs par an. Couleur brun clair d'environ 64-66 gr

Informations générales : Les poules Coucou n'ont pas besoin de coq pour pondre et peuvent produire jusqu'à 300 œufs par an à condition de bénéficier d'au moins 12 heures de lumière par jour. Pour leur confort, les poules ont besoin d'un poulailler propre qui permet de s'abriter de la pluie et de se protéger la nuit contre les prédateurs. Prévoir à minima 0,5m² d'espace par poule mais aussi des perchoirs et des nichoirs entretenus.

Nourriture : Aliment spécial poules pondeuses, déchets ménagers, vers, escargots, limaces, insectes, herbes du jardin... Consommation moyenne : 110g par jour soit 40kg par an. Important : Eau propre en permanence.

Autres besoins quotidiens :

1. Bénéficier d'un nid,
2. Gratter sol, sable, herbe...
3. Se percher,
4. Prendre un bain de soleil,
5. Prendre un bain de poussière,
6. Bénéficier d'un espace suffisant.

Santé, signe de bonne santé :

1. Poules pondeuses nées, élevées et vaccinées en France (Gard)
2. La poule doit se tenir droite sur ses deux pattes. Elle ne doit pas être recroquevillée, se tenir sur une patte, rester assise, se cacher...
3. La poule doit présenter une certaine résistance lorsque vous tentez de l'attraper. Vous pouvez attraper vos poules par une patte. Pour les porter, maintenez-la entre les ailes.
4. Crête et barbillon doivent être bien rouges. Une crête pâle, bleue ou fripée peut être le signe annonciateur d'un dysfonctionnement intestinal, d'une infection ou d'une déshydratation.
5. Examiner de temps à autre le plumage. Est-il piqué, y-a-t-il des signe de cannibalisme ?
6. Les coussinets plantaires ne doivent pas être enflés ce qui indiquerait une litière humide ou abrasive. Pas de zone douloureuse sur les doigts et les coussinets. Les griffes ne doivent pas être trop longues.
7. Tâtez le jabot pour vérifier si la poule mange normalement. Le jabot doit être souple. Si le jabot est trop dur, la poule ne boit pas assez.
8. Les poules produisent deux types de fientes. Les fientes intestinales sont solides sous une couche blanche d'urates. Les fientes caecales sont fermes, luisante de coloration noire à verte foncée. Une fiente est anormale si elle est d'un blanc laiteux, verte, jaune ou orange, ou si elle contient du sang.

FICHE TECHNIQUE

Poule Pondeuse Grise Cendrée

Gallus gallus domesticus



Caractère	Gracieuse, sociable, douce, chair ferme, non bruyante
Origine race	France
Mœurs	Diurne
Poids	1,900kg à 18 semaines et jusqu'à 2,5kg
Esp. de vie	Jusqu'à 10 ans
Œufs	Jusqu'à 290 œufs par an. Couleur brun clair d'environ 64-66 gr

Informations générales : Les poules Grises n'ont pas besoin de coq pour pondre et peuvent produire jusqu'à 290 œufs par an à condition de bénéficier d'au moins 12 heures de lumière par jour. Pour leur confort, les poules ont besoin d'un poulailler propre qui permet de s'abriter de la pluie et de se protéger la nuit contre les prédateurs. Prévoir à minima 0,5m² d'espace par poule mais aussi des perchoirs et des nidoirs entretenus.

Nourriture : Aliment spécial poules pondeuses, déchets ménagers, vers, escargots, limaces, insectes, herbes du jardin... Consommation moyenne : 110g par jour soit 40kg par an. Important : Eau propre en permanence.

Autres besoins quotidiens :

1. Bénéficier d'un nid,
2. Gratter sol, sable, herbe...
3. Se percher,
4. Prendre un bain de soleil,
5. Prendre un bain de poussière,
6. Bénéficier d'un espace suffisant.

Santé, signe de bonne santé :

1. Poules pondeuses nées, élevées et vaccinées en France (Gard)
2. La poule doit se tenir droite sur ses deux pattes. Elle ne doit pas être recroquevillée, se tenir sur une patte, rester assise, se cacher...
3. La poule doit présenter une certaine résistance lorsque vous tentez de l'attraper. Vous pouvez attraper vos poules par une patte. Pour les porter, maintenez-la entre les ailes.
4. Crête et barbillon doivent être bien rouges. Une crête pâle, bleue ou fripée peut être le signe annonciateur d'un dysfonctionnement intestinal, d'une infection ou d'une déshydratation.
5. Examiner de temps à autre le plumage. Est-il piqué, y-a-t-il des signes de cannibalisme ?
6. Les coussinets plantaires ne doivent pas être enflés ce qui indiquerait une litière humide ou abrasive. Pas de zone douloureuse sur les doigts et les coussinets. Les griffes ne doivent pas être trop longues.
7. Tâchez le jabot pour vérifier si la poule mange normalement. Le jabot doit être souple. Si le jabot est trop dur, la poule ne boit pas assez.
8. Les poules produisent deux types de fientes. Les fientes intestinales sont solides sous une couche blanche d'urates. Les fientes caecales sont fermes, luisantes, de coloration noire à verte foncé. Une fiente est anormale si elle est d'un blanc laiteux, verte, jaune ou orange, ou si elle contient du sang.

FICHE TECHNIQUE

Poule Pondeuse Noire
Gallus gallus domesticus



Caractère	Sociable, rustique, facile, attachante, non bruyante
Origine race	Europe
Mœurs	Diurne
Poids	1,800kg à 18 semaines et jusqu'à 2,5kg
Esp. de vie	Jusqu'à 10 ans
Œufs	Jusqu'à 290 œufs par an. Couleur roux à brun d'environ 64-66 gr

Informations générales : Les poules Noires n'ont pas besoin de coq pour pondre et peuvent produire jusqu'à 290 œufs par an à condition de bénéficier d'au moins 12 heures de lumière par jour. Pour leur confort, les poules ont besoin d'un poulailler propre qui permet de s'abriter de la pluie et de se protéger la nuit contre les prédateurs. Prévoir à minima 0,5m² d'espace par poule mais aussi des perchoirs et des nidoirs entretenus.

Nourriture : Aliment spécial poules pondeuses, déchets ménagers, vers, escargots, limaces, insectes, herbes du jardin... Consommation moyenne : 110g par jour soit 40kg par an. Important : Eau propre en permanence.

Autres besoins quotidiens :

1. Bénéficier d'un nid,
2. Gratter sol, sable, herbe...
3. Se percher,
4. Prendre un bain de soleil,
5. Prendre un bain de poussière,
6. Bénéficier d'un espace suffisant.

Santé, signe de bonne santé :

1. Poules pondeuses nées, élevées et vaccinées en France (Gard)
2. La poule doit se tenir droite sur ses deux pattes. Elle ne doit pas être recroquevillée, se tenir sur une patte, rester assise, se cacher...
3. La poule doit présenter une certaine résistance lorsque vous tentez de l'attraper. Vous pouvez attraper vos poules par une patte. Pour les porter, maintenez-la entre les ailes.
4. Crête et barbillon doivent être bien rouges. Une crête pâle, bleue ou fripée peut être le signe annonciateur d'un dysfonctionnement intestinal, d'une infection ou d'une déshydratation.
5. Examiner de temps à autre le plumage. Est-il piqué, y-a-t-il des signe de cannibalisme ?
6. Les coussinets plantaires ne doivent pas être enflés ce qui indiquerait une litière humide ou abrasive. Pas de zone douloureuse sur les doigts et les coussinets. Les griffes ne doivent pas être trop longues.
7. Tâchez le jabot pour vérifier si la poule mange normalement. Le jabot doit être souple. Si le jabot est trop dur, la poule ne boit pas assez.
8. Les poules produisent deux types de fientes. Les fientes intestinales sont solides sous une couche blanche d'urates. Les fientes caecales sont fermes, luisante de coloration noire à verte foncée. Une fiente est anormale si elle est d'un blanc laiteux, verte, jaune ou orange, ou si elle contient du sang.

FICHE TECHNIQUE

Poule Pondeuse Rousse Isa

Gallus gallus domesticus



Caractère	Calme, sociable, douce, attachante, robuste, non bruyante
Origine race	Europe
Mœurs	Diurne
Poids	1,800kg à 18 semaines et jusqu'à 2,2kg
Esp. de vie	Jusqu'à 10 ans
Œufs	Jusqu'à 3000 œufs par an. Couleur rosé à brun d'environ 64-66 gr

Informations générales : Les poules Rousses n'ont pas besoin de coq pour pondre et peuvent produire jusqu'à 300 œufs par an à condition de bénéficier d'au moins 12 heures de lumière par jour. Pour leur confort, les poules ont besoin d'un poulailler propre qui permet de s'abriter de la pluie et de se protéger la nuit contre les prédateurs. Prévoir à minima 0,5m² d'espace par poule mais aussi des perchoirs et des nidoirs entretenus.

Nourriture : Aliment spécial poules pondeuses, déchets ménagers, vers, escargots, limaces, insectes, herbes du jardin... Consommation moyenne : 110g par jour soit 40kg par an. Important : Eau propre en permanence.

Autres besoins quotidiens :

1. Bénéficier d'un nid,
2. Gratter sol, sable, herbe...
3. Se percher,
4. Prendre un bain de soleil,
5. Prendre un bain de poussière,
6. Bénéficier d'un espace suffisant.

Santé, signe de bonne santé :

1. Poules pondeuses nées, élevées et vaccinées en France (Gard)
2. La poule doit se tenir droite sur ses deux pattes. Elle ne doit pas être recroquevillée, se tenir sur une patte, rester assise, se cacher...
3. La poule doit présenter une certaine résistance lorsque vous tentez de l'attraper. Vous pouvez attraper vos poules par une patte. Pour les porter, maintenez-la entre les ailes.
4. Crête et barbillon doivent être bien rouges. Une crête pâle, bleue ou fripée peut être le signe annonciateur d'un dysfonctionnement intestinal, d'une infection ou d'une déshydratation.
5. Examiner de temps à autre le plumage. Est-il piqué, y-a-t-il des signes de cannibalisme ?
6. Les coussinets plantaires ne doivent pas être enflés ce qui indiquerait une litière humide ou abrasive. Pas de zone douloureuse sur les doigts et les coussinets. Les griffes ne doivent pas être trop longues.
7. Tâtez le jabot pour vérifier si la poule mange normalement. Le jabot doit être souple. Si le jabot est trop dur, la poule ne boit pas assez.
8. Les poules produisent deux types de fientes. Les fientes intestinales sont solides sous une couche blanche d'urates. Les fientes caecales sont fermes, luisantes de coloration noire à verte foncé. Une fiente est anormale si elle est d'un blanc laiteux, verte, jaune ou orange, ou si elle contient du sang.

FICHE TECHNIQUE

Poule Pondeuse Blanche Leghorn

Gallus gallus domesticus



Caractère	Robuste, sociable, dynamique, meilleure pondeuse
Origine race	Europe-Italie
Mœurs	Diurne
Poids	1,700kg à 18 semaines et jusqu'à 2,5kg
Esp. de vie	Jusqu'à 10 ans
Œufs	Jusqu'à 310 œufs par an. Couleur blanc d'environ 64-66 gr

Informations générales : Les poules blanches Leghorn n'ont pas besoin de coq pour pondre et peuvent produire jusqu'à 300 œufs par an à condition de bénéficier d'au moins 12 heures de lumière par jour. Pour leur confort, les poules ont besoin d'un poulailler propre qui permet de s'abriter de la pluie et de se protéger la nuit contre les prédateurs. Prévoir à minima 0,5m² d'espace par poule mais aussi des perchoirs et des nidoirs entretenus.

Nourriture : Aliment spécial poules pondeuses, déchets ménagers, vers, escargots, limaces, insectes, herbes du jardin... Consommation moyenne : 110g par jour soit 40kg par an. Important : Eau propre en permanence.

Autres besoins quotidiens :

1. Bénéficier d'un nid,
2. Gratter sol, sable, herbe...
3. Se percher,
4. Prendre un bain de soleil,
5. Prendre un bain de poussière,
6. Bénéficier d'un espace suffisant.

Santé, signe de bonne santé :

1. Poules pondeuses nées, élevées et vaccinées en France (Gard)
2. La poule doit se tenir droite sur ses deux pattes. Elle ne doit pas être recroquevillée, se tenir sur une patte, rester assise, se cacher...
3. La poule doit présenter une certaine résistance lorsque vous tentez de l'attraper. Vous pouvez attraper vos poules par une patte. Pour les porter, maintenez-la entre les ailes.
4. Crête et barbillon doivent être bien rouges. Une crête pâle, bleue ou fripée peut être le signe annonciateur d'un dysfonctionnement intestinal, d'une infection ou d'une déshydratation.
5. Examiner de temps à autre le plumage. Est-il piqué, y-a-t-il des signes de cannibalisme ?
6. Les coussinets plantaires ne doivent pas être enflés ce qui indiquerait une litière humide ou abrasive. Pas de zone douloureuse sur les doigts et les coussinets. Les griffes ne doivent pas être trop longues.
7. Tâchez le jabot pour vérifier si la poule mange normalement. Le jabot doit être souple. Si le jabot est trop dur, la poule ne boit pas assez.
8. Les poules produisent deux types de fientes. Les fientes intestinales sont solides sous une couche blanche d'urates. Les fientes caecales sont fermes, luisantes de coloration noire à verte foncée. Une fiente est anormale si elle est d'un blanc laiteux, verte, jaune ou orange, ou si elle contient du sang.

FICHE TECHNIQUE

Poule Pondeuse Sussex

Gallus gallus domesticus



Caractère	Bonne couveuse, sociable, facile, chair ferme, non bruyante
Origine race	France
Mœurs	Diurne
Poids	1,900kg à 18 semaines et jusqu'à 2,5kg
Esp. de vie	Jusqu'à 10 ans
Œufs	Jusqu'à 290 œufs par an. Couleur roux d'environ 64-66 gr

Informations générales : Les poules Sussex n'ont pas besoin de coq pour pondre et peuvent produire jusqu'à 290 œufs par an à condition de bénéficier d'au moins 12 heures de lumière par jour. Pour leur confort, les poules ont besoin d'un poulailler propre qui permet de s'abriter de la pluie et de se protéger la nuit contre les prédateurs. Prévoir à minima 0,5m² d'espace par poule mais aussi des perchoirs et des nidoirs entretenus.

Nourriture : Aliment spécial poules pondeuses, déchets ménagers, vers, escargots, limaces, insectes, herbes du jardin... Consommation moyenne : 110g par jour soit 40kg par an. Important : Eau propre en permanence.

Autres besoins quotidiens :

1. Bénéficier d'un nid,
2. Gratter sol, sable, herbe...
3. Se percher,
4. Prendre un bain de soleil,
5. Prendre un bain de poussière,
6. Bénéficier d'un espace suffisant.

Santé, signe de bonne santé :

1. Poules pondeuses nées, élevées et vaccinées en France (Gard)
2. La poule doit se tenir droite sur ses deux pattes. Elle ne doit pas être recroquevillée, se tenir sur une patte, rester assise, se cacher...
3. La poule doit présenter une certaine résistance lorsque vous tentez de l'attraper. Vous pouvez attraper vos poules par une patte. Pour les porter, maintenez-la entre les ailes.
4. Crête et barbillon doivent être bien rouges. Une crête pâle, bleue ou fripée peut être le signe annonciateur d'un dysfonctionnement intestinal, d'une infection ou d'une déshydratation.
5. Examiner de temps à autre le plumage. Est-il piqué, y-a-t-il des signes de cannibalisme ?
6. Les coussinets plantaires ne doivent pas être enflés ce qui indiquerait une litière humide ou abrasive. Pas de zone douloureuse sur les doigts et les coussinets. Les griffes ne doivent pas être trop longues.
7. Tâchez le jabot pour vérifier si la poule mange normalement. Le jabot doit être souple. Si le jabot est trop dur, la poule ne boit pas assez.
8. Les poules produisent deux types de fientes. Les fientes intestinales sont solides sous une couche blanche d'urates. Les fientes caecales sont fermes, luisantes, de coloration noire à verte foncé. Une fiente est anormale si elle est d'un blanc laiteux, verte, jaune ou orange, ou si elle contient du sang.

